



# MY WAY TO GROW



## SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick

Fertilization plan  
Coco cultivation

Bemestingsschema  
Kokos

Plan de fertilización  
para cultivo en Coco

## MAIN FERTILIZERS

## STIMULATORS

|  | Coco Forte A | Coco Forte B | EC** | ML / 10 LTR | Roots | X-cel | The Missing Link | BN-Zym | Vitasol | Silution |
|--|--------------|--------------|------|-------------|-------|-------|------------------|--------|---------|----------|
| Growth period<br>Groeiperiode<br>Período de crecimiento                            | 9            | 9            | 0,9  |             | 8     | 5     | 6                | 5      | -       | 2        |
| Start flowering phase<br>Start bloeiperiode<br>Comienzo (o principio) de floración | 13           | 13           | 1,2  |             | 7     | 5     | 6                | 5      | -       | 2        |
|  | 16           | 16           | 1,4  |             | 5     | 8     | 6                | 5      | -       | 2        |
|  | 18           | 18           | 1,6  |             | -     | 8     | 6                | 5      | -       | 2        |
| Mid flowering phase<br>Midden bloeiperiode<br>Mitad floración                      | 18           | 18           | 1,6  |             | -     | 10    | 6                | 5      | -       | 2        |
|  | 18           | 18           | 1,6  |             | -     | 10    | 6                | 5      | 4       | 2        |
|  | 18           | 18           | 1,6  |             | -     | 10    | 6                | 5      | 7       | 2        |
| Last flowering phase<br>Laatste bloeiperiode<br>Fin de la floración                | 16           | 16           | 1,4  |             | -     | 10    | 6                | 5      | 8       | 2        |
|  | <13          | <13          | 1,2  |             | -     | 10    | 6                | 5      | 10      | 2        |
| Rinse last week<br>Laatste week spoelen<br>Enjuagar la ultima semana               | -            | -            | -    |             | -     | -     | -                | 5      | 7       | -        |

The most cost-effective fertilizers in the world?

WWW.BIONOVA.NL



FACEBOOK.COM/BIONOVAPREMIUM



INSTAGRAM.COM/BIONOVANUTRIENTS



### Tips Coco

- When using Coco Forte A+B: first mix A in the vessel, then mix in B.
  - When using Silution, first add water to the feed vessel, then silution and stir well. Wait 30 minutes, then mix in the main fertilizers and stimulators.
  - Adjust the pH to ± 5.5 – 6.5.
  - For the best results we recommend to use our Cocomix Plus or Coco Bricks.
  - In areas of soft water or when using RO-water, it is recommended to add Ca 15 (± 4 ml./10 liters) and MgO 10 (± 4 ml./10 liters) to the fertilizer mix.
  - The dosage of fertilizers can be adjusted in steps of 10% more or less.
  - For long flowering plants and when using Longflower-Supermix, the schedule should be extended from mid flowering.
- \*\* EC value is measured with Reverse Osmosis water with EC 0.0.



Longflower Supermix



Autoflower Supermix

### Tips Kokos

- Bij gebruik Coco Forte A+B: eerst A mengen, daarna B erbij mengen.
  - Wanneer Silution gebruikt wordt, eerst water aan de tank toevoegen, daarna Silution toevoegen en goed roeren. Wacht 30 minuten, daarna de hoofdmeststoffen en stimulatoren mixen.
  - pH stellen naar ± 5.5 – 6.5.
  - Voor optimaal resultaat raden wij aan onze Cocomix Plus of Coco Bricks te gebruiken.
  - In gebieden met zacht water of met gebruik van RO-water, is het aanbevolen Ca 15 (± 4 ml./10 liter) en MgO 10 (4 ml./10 liter) aan de meststoffenmix toe te voegen.
  - De dosering van de hoofdmeststof mag ± 10% aangepast worden.
  - Bij langbloeiende planten en het gebruik van Longflower-Supermix moet het schema verlengd worden vanaf middern bloefase.
- \*\* EC waarden zijn gemeten in Osmose water met EC 0.0.

### Consejos Coco

- Cuando use Coco Forte A + B: primero mezcle A en el tanque, luego agregue y mezcle B.
  - Cuando use Silution, primero agregue agua al tanque de alimentación, luego Silution y revuelva bien. Espere 30 minutos y luego mezcle los fertilizantes principales y los estimuladores.
  - Ajuste el pH a ± 5.5 - 6.5.
  - Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar nuestro Cocomix Plus o Coco Bricks.
  - En áreas de agua blanda o cuando se usa agua RO, se recomienda agregar Ca 15 (± 4 ml./10 litros) y MgO 10 (± 4 ml./10 litros) a la mezcla de fertilizante.
  - La dosis de fertilizantes se puede ajustar en pasos de más o menos 10%.
  - Para plantas de floración larga y cuando se usa Longflower-Supermix, el programa debe ser extendido desde mediados de floración.
- \*\* El valor EC se mide con agua de ósmosis inversa con CE 0.0.